



FG: 9

PRODUCCIÓN: CINEGÉTICA: ciervo /corzo.

Orientación productiva: Repoblación

Adaptación al entorno: sin dificultad de adaptación en Galicia / norte de Portugal.

Combinabilidad con otras producciones: Baja

Principales amenazas: La fauna salvaje y algunas enfermedades y parásitos como *Hypoderma actaeon*, una larva subcutánea de un díptero Oéstrido, que provoca intensas reacciones hemorrágicas bajo la piel de los corzos y ciervos infectados.

Razas: El corzo (*Capreolus capreolus capreolus*) y el ciervo (*Cervus elaphus bolivari*)

Inversiones:

Compra de animales. Cerramientos cinegéticos y vallados perimetrales, así como módulos de manejo y capturaderos. Si no se dispone de charcas, balsas, etc. es interesante su creación. Se requieren condiciones de manejo e instalaciones que permitan preservar el carácter salvaje: entorno tranquilo, diversidad de hábitat (masa arbórea y pasto) y ondulaciones de relieve (variación de altitud y orientación).

Es común que se produzcan daños en plantaciones por ramoneo y sobretodo en la época de escodado, donde los machos pueden afectar a varios árboles. Esto deberá tenerse en cuenta para analizar la necesidad de protectores en las plantaciones.

Reproducción:

En el ciervo la época de celo va de agosto a septiembre, en el apareamiento un solo macho puede reproducirse con varias hembras. El parto se produce ocho meses después (mayo – junio), dando lugar a una cría, excepcionalmente 2. Durante los tres primeros meses las crías se alimentan de leche materna.

Las hembras son adultas a los 1-2 años y los machos a los 2-3.

En los corzos el celo o berrea y partos se producen en la misma época que el ciervo ya que, aun siendo de menor tamaño, presentan la diapausa embrionaria en el ciclo reproductivo.

Alimentación:

La presencia humana debe ser la menor posible, para evitar su “adaptación” al hombre. Solo se debe suplementar en situaciones de estricta necesidad, siendo preferible apoyarse en siembras de cereal (centeno por ejemplo) o veza – avena.

En el caso del ciervo prefieren pasto de gramíneas y hierba, suplementado con frutos como bellota o castaña en otoño. El corzo además de pastar, le gusta ramonear, alimentándose de hojas y brotes de especies arbóreas y arbustivas.

Se estima que las necesidades de alimento son mayores en el corzo que en el ciervo.

Aprovechamiento y comercialización:

El destino es la repoblación. Tener página web propia o anunciarse en revistas de caza ayuda a darse a conocer para atraer a potenciales clientes. También se pueden ofertar servicios complementarios como el asesoramiento o la propia adecuación de la zona a repoblar, la densidad ideal, el transporte y la suelta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://digital.csic.es/bitstream/10261/112748/1/capcap_v4.pdf

<http://www.fao.org/3/t8850s06.htm>

<https://www.corzo.info/>

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/02_12_11_Trabajo_ciervo.pdf

<http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/cerela.html>

<http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/capcap.html>